



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 47%

Date: Jumat, Februari 01, 2019

Statistics: 1841 words Plagiarized / 3911 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

TINGKAT PEROMBAKAN BAHAN ORGANIK SEDIMENT WADUK CIRATA PADA KONDISI ANAEROBIK SKALA LABORATORIUM 1) (The Organics Metter Decomposition level of Cirata Reservoir Sediment in Anaerobic on Laboratory Treatment) Purnamawati1), Kukuh Nirmala2), dan Tri Heru Prihadi3) 1) Staf Pengajar Jurusan IKP Politeknik Negeri Pontianak, Email : Pur_polnep@yahoo.com,) Staf Pengajar FPIK Institut Pertanian Bogor dan 3) Staf Peneliti Pusat Riset Perikanan Budidaya

ABSTRAK Semakin banyak KJA yang beroperasi akan semakin banyak limbah organik berupa buangan sisa pakan dan feses yang terakumulasi dalam Waduk Cirata. Seiring dengan meningkatnya bahan organik akan menyebabkan menurunnya konsentrasi oksigen (DO) di lapisan hipolimnion, hal ini terjadi karena oksigen dibutuhkan mikroorganisme (bakteri aerob dan bakteri anaerob) untuk merombak bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bila aktivitas bakteri pengurai ini berlangsung intensif, maka kualitas air waduk akan menjadi anaerob. Yang mana saat terjadi proses perombakan sisa pakan/kotoran akan membebaskan unsur hara N, P, dan K yang mengakibatkan cadangan DO di perairan menjadi berkurang. Penelitian tingkat Perombakan Bahan Organik Sedimen Waduk Cirata Pada Kondisi Anaerobik Skala Laboratorium telah dilakukan pada bulan Oktober 2008–Desember 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat perombakan bahan organik sedimen Waduk Cirata pada kondisi anaerob. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, penelitian dilakukan di Laboratorium Lingkungan Perairan Departemen Akuakultur FPIK–IPB. Kegiatan penelitian di laboratorium menggunakan 9 buah akuarium dengan ukuran 30 cm x 40 cm x 60 cm. Setiap 3 aquarium diisi sampel sedimen dasar yang berasal dari Waduk Cirata setinggi ± 10 cm/aquarium/stasiun dan penambahan air ± 40 cm/aquarium. Semua aquarium yang digunakan ditutup dengan plastik berwarna hitam. Parameter kualitas air yang di ukur pada saat pengamatan di laboratorium meliputi suhu, DO, karbondioksida (CO₂), total fosfat,

ortho phospat (PO_4), nitrit (NO_2), nitrat (NO_3), amoniak (NH_3), alkalinitas, kesadahan, sulfida total (H_2S), COD, BOD Ca, dan C-Organik dilakukan pada hari ke 0, 20, 40, dan 60. Sedangkan parameter yang diukur setiap hari yaitu: Redoks, suhu, DO, pH. Pengamatan jumlah dan jenis bakteri dilakukan pada awal dan akhir penelitian (hari ke 0 dan 60). Analisis kualitas air dan analisis sedimen hasil penelitian dilakukan di Laboratorium Lingkungan Perairan Departemen Akuakultur FPIK-IPB dan analisa bakteri hasil pengamatan di laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi. Semua data di paparkan secara deskriptif dan di analisis cluster (Cluster Analysis), diinterpretasikan dalam bentuk Dendrogram. Dari hasil analisis deskriptif fisika kimia air dan sedimen yang dilihat pada grafik pola dinamika tingkat perombakan menunjukkan pada hari ke-20 terjadinya degradasi bahan organik dan reduksi (pengurangan oksigen), tingginya nilai sulfida, BOD, amonia, nitrit dan nitrat. Sehingga menunjukkan bahwa proses dekomposisi yang terjadi pada sedimen termasuk dalam kategori anaerobik. Sebaran karakteristik fisika kimia air dan sedimen memperlihatkan bahwa Stasiun 3 (dibagian out let) memiliki nilai nitrit yang tinggi. Kata kunci : waduk cirata, anaerobik, perombakan bahan organik, sedimen

ABSTRACT Even more of KJA that operated would even more organic wastes took the form of the outcast of food and faeces that was accumulated in the Cirata Reservoir. Together with the increase in the organic matter will cause the decline in the concentration of oxygen (DO) in the layer hipolimnion, this happened because of oxygen was needed by micro-organisms (the aerobe bacteria and the anaerobe bacteria) to reorganise the organic matter to the simpler compound. When the activity of the anaerobe bacteria this took place intensive, then the quality of reservoir water will become the anaerobe. Whichever when the process of reform of food happening/the waste will release the element of the N nutrient, P, and K that resulted in the DO reserve in waters to decreased. The level research of Organics Metter Decomposition level of Cirata Reservoir Sediment in Anaerobic Reform for the Scale of the Laboratory was carried out in October 2008 until Desember 2008. The aim of this research was to see the level of Cirata reform of the organic matter of Reservoir sediment in the condition for the anaerobe. This research used the descriptive method, the research was carried out in the Agricultural Departement Laboratory of FPIK IPB. The research in laboratory used 9 aquariums with the measurement 30 cm x 40 cm x 60 cm. Every time 3 aquarium was filled up the sample of basic sediment that came from the Cirata Reservoir be as high as 10 cm/aquarium/the station and the increase in water 40 cm/aquarium. All aquarium that was used was closed with coloured plastic black. The quality parameter of water that in measured when observation in the laboratory covered the temperature, DO, carbon dioxide (CO_2), the total phosphate, ortho phospat (PO_4), nitrit (NO_2), the nitrate (NO_3), ammonia (NH_3), the alkalinity, the hardness, sulfida the total (H_2S), COD, BOD, Ca, and C-Organik were done on the day to 0, 20, 40, and 60. Whereas the parameter that was measured every day that is: Redoks, the temperature, DO, pH.

Pengamatan of the number and the kind the bacteria was done at the beginning and the research end (the day to 0 and 60). The analysis of the quality of water and the analysis of sediment was produced by the research carried out in the Agricultural Departement Laboratory of FPIK IPB Aquaculture and the analysis of the bacteria produced by observation in the Departement Microbiology laboratory of Biology. All the datas in explained descriptively and in the analysis cluster (Cluster Analysis), was interpreted in the form of Dendrogram. From results of the descriptive analysis of physics and sediment of water chemistry that were seen in the pattern graph of the dynamics of the level of reform menujukkan on the day of the 20 occurrences of the degradation of the organic matter and the reduction (the reduction in oxygen), the height thought sulfida, BOD, ammonia, nitrit and the nitrate. So as showed that the process of decomposition that happened to sediment including in the anaerobic category. The distribution of physics of water chemistry and sediment of the characteristics showed that the station 3 (out let) had the value nitrit that was high.

Keywords: The reservoir cirata, anaerobic, organic matter reform, sediment

PENDAHULUAN

Waduk Cirata menerima berbagai masukan limbah dari area sekitarnya, limbah tersebut bisa berasal dari kegiatan industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, dan sisa buangan dari kegiatan perikanan keramba jaring apung (KJA) berupa limbah organik seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa perikanan budidaya intensif dan pengkayaan nutrien berdampak potensial pada perubahan kualitas air (Nastiti et al., 2001; Philips et al., 1993; Boyd, 1999). Selanjutnya Mc Donald et al. (1996) dan BPWC (2009) menyatakan bahwa 30% dari jumlah pakan yang diberikan tertinggal sebagai pakan yang tidak dikonsumsi dan 25% dari pakan yang dikonsumsi akan diekskresikan ini berarti bahan organik yang masuk ke badan air cukup besar. Menurut Kartamihardja (1998) secara fisik, buangan sisa pakan dan kotoran ikan akan meningkatkan laju sedimentasi perairan. Dalam proses selanjutnya, sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar perairan tersebut akan mengalami dekomposisi dan pembusukan, yang akan menghasilkan gas-gas beracun seperti amonia dan H₂S.

Salah satu sumber toksitas penyebab kematian ikan yang dibudidayakan terjadi pada saat pembalikan air di Waduk Cirata, terjadinya difisit oksigen di hipolimnion, dan akibat naiknya gas-gas beracun dari dasar perairan ke permukaan (upwelling) terutama pada saat musim hujan. Ketersediaan gas-gas beracun pada dasar perairan tergantung pada kecepatan proses perombakan oleh bakteri pengurai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tingkat perombakan bahan organik pada sedimen Waduk Cirata dalam kondisi anaerobik, sehingga diketahui pola dinamika perombakan bahan organik di air dan sedimen. Tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk melihat tingkat perombakan bahan organik sedimen Waduk Cirata pada kondisi anaerob dan mengetahui sebaran karakteristik fisika-kimia perairan dan sedimen antar stasiun pengamatan METODE PENELITIAN Kegiatan dilakukan di laboratorium meliputi pengamatan sedimen dari Waduk Cirata yang dilaksanakan selama 2 bulan (Oktober sampai Desember 2008) dan analisa data.

Analisa sampel dilakukan di Laboratorium Lingkungan Perairan Departemen Akuakultur FPIK-IPB dan di Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi. Kegiatan penelitian di laboratorium menggunakan 9 buah akuarium dengan ukuran 30 cm x 40 cm x 60 cm. Setiap 3 aquarium diisi sampel sedimen dasar yang berasal dari Waduk Cirata setinggi ± 10 cm/aquarium/stasiun dan penambahan air ± 40 cm/aquarium.

Semua aquarium yang digunakan ditutup dengan plastik berwarna hitam. Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, DO, karbondioksida (CO₂), total fosfat, orto fospat (PO₄3--P), nitrit (NO₂--N), nitrat (NO₃--N), amoniak (NH₃+-N), alkalinitas, kesadahan, sulfida total (H₂S), COD, BOD Ca, dan C-Organik dilakukan pada hari ke 0, 20, 40, dan 60. Sedangkan parameter yang diukur setiap hari yaitu: Redoks, suhu, DO, pH. Pengamatan jumlah dan jenis bakteri dilakukan pada awal dan akhir penelitian (hari ke 0 dan 60). Semua data di paparkan secara deskriptif dan di analisis cluster (Cluster Analysis) (Bengen, 2000), diinterpretasikan dalam bentuk Dendrogram (Iriawan dan Astuti, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Fisika Kimia Air dan Sedimen Hasil pengamatan terhadap pola dinamika nilai fisika kimia air dan sedimen selama penelitian disajikan pada Tabel 1, yang meliputi BOD, Amonia (NH₃), Nitrit (NO₂), dan Nitrat (NO₃) ditunjukkan pada Gambar 1A, C-organik (Gambar 1B), oksigen terlarut (DO) (Gambar 1C), potensial redoks (Gambar 1D), pH (Gambar 1E), karbondioksida (CO₂), Alkalinitas, Kesadahan (Gambar 1F), Kalsium air (Ca) (Gambar 1G), kalsium sedimen (Ca) (Gambar 1H), COD (Gambar 1I), Total fosfat dan Orto fosfat (PO₄3--P) (Gambar 1J), Suhu (Gambar 1K), oksigen terlarut (DO) (Gambar 1C), potensial redoks (Gambar 1D), Suhu (Gambar 1K). Dan hasil analisis bakteri pada media selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 1.

Kisaran nilai rerata fisika kimia air dan sedimen pada hari ke 0, 20, 40 dan 60 selama penelitian. Parameter_Rerata _ _0 _20 _40 _60 _ _Fisika Air _ _Suhu (0C) _27,1 _27,1 _27,8 _26,5 _ _pH _7,13 _6,69 _6,99 _6,85 _ _Kimia Air _ _Oksigen terlarut (DO) (mg/L) _0,47 _0,13 _0,03 _0,06 _ _Karbondioksida (CO₂) (mg/L) _12,54 _50,16 _31,02 _29,70 _ _Sulfide (mg/L) _<0,02 _<0,02 _<0,02 _<0,02 _ _Amonia (NH₃) (mg/L) _0,07 _3,51 _3,14 _1,48 _ _Nitrit (NO₂) (mg/L) _0,03 _5,12 _0,31 _0,26 _ _Nitrat (NO₃) (mg/L) _0,22 _1,67 _1,77 _1,77 _ _Fenol (mg/L) _<0,05 _<0,05 _<0,05 _<0,05 _ _BOD (mg/L) _1,63 _5,78 _2,40 _1,44 _ _COD (mg/L) _14,23 _13,23 _5,50 _5,33 _ _Total fosfat (mg/L) _1,31 _1,70 _0,81 _0,80 _ _Orto fosfat (PO₄) (mg/L) _0,62 _1,39 _0,62 _0,63 _ _Alkalinitas (mg/L) _72,97 _114,27 _165,77 _150,96 _ _Kesadahan (mg/L) _47,05 _116,41 _157,52 _130,84 _ _Kalsium (Ca) (mg/L) _8,29 _19,71 _18,04 _18,71 _ _Fisika sedimen _ _Suhu

(0C) _27,1 _27,0 _27,7 _26,3 _pH _6,95 _6,56 _6,76 _6,77 _Potensial redoks (mV) _-7
_ -20 _-9 _-3 _Kimia Sedimen _Oksigen terlarut (DO) (mg/L) _0,23 _0,04 _0,01 _0,02
_Kalsium (Ca) (mg/kg) _2,48 _3,88 _5,43 _5,83 _C-Organik (%) _5,10 _1,74 _2,51
_1,95 _ Tabel 2. Hasil analisis bakteri pada media selama penelitian Sampel _Jenis / kelompok _Jumlah _Awal _SRB (Sulfur Reducing Bacteria)/ kelompok Desulfobacter _4,4 x 10² MPN _Akhir _1,1 x 10⁴ MPN _Kisaran nilai BOD, amonia, nitrit dan nitrat (mg/L) _Kisaran nilai C-organik (%) _Kisaran nilai DO (mg/L)
_Kisaran nilai potensial redoks (mV) _Kisaran nilai pH _Kisaran nilai CO₂, alkalinitas dan kesadahan (mg/L) _Kisaran nilai kalsium air (mg/L)
_Kisaran nilai kalsium sedimen (mg/kg) _Kisaran nilai COD (mg/L)
_Kisaran nilai total fosfat dan ortofosfat (mg/L) _Kisaran nilai suhu air dan sedimen (oC) _ Gambar 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K nilai rerata parameter fisika kimia air dan sedimen pada hari ke 0, 20, 40 dan 60 selama penelitian Tabel 1 dan Gambar 1A, dapat dilihat bahwa kisaran nilai BOD, amonia, nitrit, dan nitrat pada hari ke-0 relatif masih dalam tahap transisi dan pada hari ke-20 adalah puncak nilai tertinggi, setelah itu grafiknya sampai hari ke-60 terus menurun.

Tingginya nilai BOD, amonia, nitrit, dan nitrat pada hari ke-20 ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas organisme dalam menguraikan bahan organik. Tingginya nilai BOD pada hari ke-20 masih berbanding lurus dengan kandungan oksigen yang tersedia pada media. Setelah hari ke-20 nilai BOD terus menurun, artinya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme semakin sedikit, hal ini berhubungan dengan ketersediaan oksigen terlarut pada air maupun sedimen yang terus menurun. Kondisi ini juga ditunjukkan oleh nilai amonia dan nitrit pada hari ke-20 adalah nilai puncak tertinggi kemudian grafiknya terus menurun. Penurunan nilai amonia ini disebabkan oleh tidak adanya sumber utama yang masuk pada media yang ditreatmen. Penurunan amonia ini juga berakibat pada penurunan nitrit, karena nitrit adalah konversi amonia oleh bakteri nitrifikasi yang berlebihan.

Nilai nitrat (Gambar 1A) pada hari ke-40 dan hari ke-60, menunjukkan grafik yang terus naik dan berada pada nilai yang stabil dikarenakan masih ada tersedianya oksigen pada perairan walaupun sedikit. Walaupun menurut Boyd (1982) menyebutkan nitrit berasal dari proses reduksi nitrat oleh bakteri dalam kondisi anaerobik di dalam air, tetapi karena sifat dari nitrit yang tidak stabil, sehingga nilainya terus menurun, hal ini dipengaruhi oleh kandungan oksigen yang terus menurun sehingga proses nitrifikasi tidak berjalan dengan sempurna. Hal lain yang menyebabkan nitrit terus menurun adalah nilai pH yang terukur selama pengamatan (>7), nilai ini masih di bawah nilai pH standar untuk proses nitrifikasi (8-9) (Novonty dan Olem, 1994 dalam Effendi, 2007). Penurunan nilai nitrit disebabkan oleh sumber utama untuk proses nitrifikasi yaitu nitrogen dalam perairan semakin berkurang, karena nitrat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Keadaan oksigen semakin menurun, ion nitrat dapat sebagai penerima elektron dalam reaksi-reaksi dengan

mikroorganisme sebagai perantara. Kemampuan ion nitrat sebagai penerima elektron digunakan dalam proses perombakan untuk menghilangkan elektron dengan membiarkan ion nitrat mengoksidasi methanol melalui reaksi bermedia bakteri dalam kondisi anaerob. Pemanfaatan nitrat dalam proses dekomposisi anaerobik akan menghasilkan amonia (NH_3) yang bersifat toksik bagi organisme perairan.

Metcalf dan Edy (1991) menyatakan, senyawa amonia dalam kondisi aerob akan teroksidasi menjadi nitrit oleh bakteri autotrof melalui proses mikrobiologi. Menurut Effendi, (2007) reduksi nitrat (denitrifikasi) oleh aktivitas bakteri pada kondisi anaerob, penurunan nitrat ini berpengaruh kepada penurunan kandungan C-organik dalam perairan dan sedimen, karena penurunan nitrat menggambarkan pada perairan tersebut tidak ada nutrien utama untuk pertumbuhan.

Gambar 1B menunjukkan nilai C-organik cenderung menurun hingga hari ke-20 dan meningkat kembali pada hari ke-40, hal ini karena hasil dari dekomposisi yang mengendap di dasar perairan terus meningkat dan umumnya kandungan C-organik di sedimen berkisar antara ~ 1–5 % (Chester, 1990) dalam Taberima (1999) tetapi pada hari ke-60 kembali menurun. Sehingga kondisi air dan sedimen yang diamati selama pengamatan sudah tidak menggambarkan adanya proses dekomposisi secara aerob, maka proses dekomposisi yang terjadi pada sedimen termasuk dalam kategori anaerobik. Kondisi anaerobik ini juga digambarkan oleh nilai total fosfat dan ortofosfat (Gambar 2J). Pada hari ke-20 nilai kedua parameter ini cenderung naik. diduga pada saat kondisi anaerob ion besi valensi tiga (ferri) ini mengalami reduksi menjadi ion besi valensi dua (ferro) yang bersifat larut dan melepaskan fosfat keperairan, sehingga meningkatkan keberadaan fosfat diperairan (Brown, 1987), sehingga pada hari ke-20 sudah bisa dikategorikan media air dan sedimen sudah anaerob. Keadaan reduksi anaerobik ini mencerminkan bahwa reaksi kimia yang terjadi pada sedimen mengalami penambahan elektron akibat anaerob. Tebbut (1992) mengatakan, suatu reaksi pada kondisi anaerob memiliki nilai Oxidation-Reduction Potensil (ORP) <50 mV. Selanjutnya Boyd (1988) menyatakan, pada lumpur dasar perairan yang memiliki kondisi anaerob, nilai ORP dapat mencapai $-0,1$ mV. Menurut Abdunnur et al. (2004) dalam Suwoyo (2009) bahwa proses dekomposisi bahan organik dapat terjadi baik dalam kondisi reduksi maupun oksidasi. Hal ini membuktikan bahwa proses dekomposisi bahan organik yang terjadi berjalan secara anaerobik, hal ini dikuatkan dengan nilai potensial redoks hasil pengamatan yang masuk dalam kondisi anaerobik yaitu <-3 mV. Lebih lanjut Emiryati (2004) dan Suwoyo (2009) mengemukakan bahwa kandungan oksigen dalam sedimen berpengaruh besar terhadap nilai potensial redoks dan pH sedimen. Banyaknya bahan organik, jumlah bakteri yang hidup dalam substrat dan kurangnya sirkulasi air menyebabkan kadar oksigen dalam substrat menurun. Keadaan ini dapat mengubah kondisi substrat kedalam lingkungan reduksi. Maka dari itu potensial

redoks (Gambar 1D) terus menunjukkan kondisi reduktif. Konsentrasi fenol selama penelitian ditampilkan pada Tabel 1, menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan kisaran nilai $<0,05$ mg/L. Di duga kisaran nilai ini dipengaruhi oleh potensial redoks. Menurut Haerudin (2006), nilai fenol akan semakin rendah dengan semakin meningkatnya potensial redoks. Hal lain yang menguatkan proses dekomposisi yang terjadi sudah termasuk anaerobik adalah kelimpahan bakteri yang teridentifikasi pada sedimen media penelitian berkisar dari $4,4 \times 10^2$ sampai pada $1,1 \times 10^4$ (Tabel 2) termasuk pada bakteri pereduksi sulfur (SRB).

Bakteri SRB adalah bakteri obligat anaerob yang menggunakan sulfat sebagai akseptor terminal elektron (Moriaty dan Paullin, 1987). Meningkatnya aktivitas organisme anaerob melakukan penguraian dan dekomposisi bahan organik, di duga akan meningkatkan pula nilai CO₂ pada perairan (Gambar 1F) sampai hari ke-20. Karena dekomposisi karbohidrat oleh bakteri anaerob pada bagian dasar perairan akan menghasilkan karbondioksida sebagai produk akhir.

Jeffries dan Mills (1996) menegaskan, pada saat proses dekomposisi berlangsung mikroorganisme melepaskan karbondioksida ke perairan. Dengan mikroorganisme melepaskan CO₂ keperairan, ini merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan nilai pH baik dalam air maupun sedimen sampai ukuran analitik (Gambar 1E) sebagai akibat dari proses penguraian atau dekomposisi bahan organik. Tetapi setelah hari ke-20 nilai CO₂ terus menurun, ini sejalan dengan nilai pH, alkalinitas, dan kesadahan yang mengalami kenaikan sampai hari ke-40 (Gambar 1F). Setelah hari ke-40 nilai alkalinitas dan kesadahan mulai turun diduga karena persaingan pemanfaatan bahan organik yang terus meningkat tetapi tidak ada penambahan lagi sumber bahan organik yang dimasukan pada media penelitian. Pendapat ini didukung oleh Mc Kereth et.al. (1980) dalam Effendi (2007), pH berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas, dimana semakin tinggi nilai pH, maka akan semakin tinggi nilai alkalinitas dan semakin sedikit kadar karbondioksida bebas. Pada Gambar 1G kadar kalsium air hari ke-20 meningkat dan pada Gambar 1H kadar kalsium sedimen terus meningkat hingga hari ke-60.

Meningkatnya kadar kalsium ini di duga akibat terbentuknya senyawa-senyawa kalsium karbonat sehingga terbentuknya endapan pada dasar perairan. Karena kesadahan kalsium karbonat merupakan kesadahan yang sifatnya sementara (Boyd, 1988). Karena kondisinya sudah anaerob, maka konsentrasi sulfida air selama penelitian menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan kisaran nilai $<0,02$ mg/L dan mengeluarkan bau busuk dari media penelitian. Dengan konsentrasi H₂S $<0,02$ mg/L di duga pada pH < 8 kesetimbangan bergeser pada pembentukan H₂S yang terionisasi. Apabila diperairan tidak terdapat oksigen maka sulfat berperan sebagai sumber oksigen dalam proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Karena pada kondisi ini, ion sulfat direduksi menjadi ion sulfit yang membentuk kesetimbangan dengan ion hidrogen untuk membentuk hidrogen sulfida. Maka dari itu konsentrasi sulfida pada penelitian ini bearada pada nilai $<0,02$ mg/L. Selanjutnya Effendi (2007) menyatakan, pada pH 5, sekitar 99% sulfur terdapat dalam bentuk

H₂S. Pada kondisi ini, tekanan parsial H₂S dapat menimbulkan permasalahan bau yang cukup serius. H₂S bersifat mudah larut, toksik, dan H₂S menimbulkan bau seperti telur busuk. Dan bau busuk yang dikeluarkan, karena telah terjadi reduksi (pengurangan oksigen dan penambahan hidrogen), anion sulfat menjadi hidrogen sulfida pada kondisi anaerob yang dilakukan oleh bakteri SRB (Sulfur Reducing Bacteria) selama proses dekomposisi bahan organik (Effendi, 2007). Sebaran karakteristik Fisika-Kimia dan Sedimen Berdasarkan penyebaran stasiun pengamatan diperoleh adanya dua pengelompokan untuk kualitas air dan sedimen.

Pengelompokan tersebut dikonfirmasikan dengan dendogram klasifikasi hirarki berdasarkan 14 parameter kualitas air (Gambar 2A) dan 6 parameter sedimen (Gambar 2B). Dari hasil analisis cluster (Cluster Analysis) Gambar 2A terlihat bahwa pengelompokan stasiun berdasarkan parameter fisika kimia air secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada derajat kesamaan 99,5% terdapat dua kelompok besar dan Gambar 2B parameter fisika kimia sedimen juga menunjukkan bahwa pada derajat kesamaan 99,6% juga membentuk dua kelompok besar. Kelompok 1 terdiri dari stasiun 1 dan 2. Kelompok 2 terdiri dari stasiun 3. Dikelompokannya stasiun 1 dan 2 karena memiliki alkalinitas, kesadahan dan kalsium yang relatif sama. Stasiun 3 membentuk kelompok sendiri karena memiliki nilai nitrit yang tinggi. Tingginya nilai nitrit pada stasiun 3 ini dimungkinkan terjadinya akumulasi karena secara umum bahan organik dari sisa pakan yang tidak tercerna terbawa oleh arus dari kegiatan KJA yang terdapat pada stasiun 2 sehingga merupakan tempat mengendap dan menumpuknya bahan-bahan organik yang berasal dari bagian inlet dan bagian pertengahan. Odum (1971) menyatakan bahwa kecepatan arus secara tidak langsung mempengaruhi substrat dasar perairan. — — — A — B — Gambar 3. Dendogram pengelompokan antar stasiun untuk (A) kualitas air dan (B) sedimen

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : Dari hasil analisis deskriptif fisika kimia air dan sedimen yang dilihat pada grafik pola dinamika tingkat perombakan menujukkan pada hari ke-20 terjadinya degradasi bahan organik dan reduksi (pengurangan oksigen dan penambahan hidrogen), anion sulfat menjadi hidrogen sulfida, serta tingginya nilai BOD, amonia, nitrit dan nitrat. Sehingga menunjukkan bahwa proses dekomposisi yang terjadi pada sedimen termasuk dalam kategori anaerobik. Sebaran karakteristik fisika kimia air dan sedimen memperlihatkan bahwa Stasiun 3 (dibagian out let) memiliki nilai nitrit yang tinggi. Saran Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika perombakan bahan organik secara anaerob pada sedimen Waduk Cirata pada hari ke 20, berdasarkan hasil ini maka dilakukan pengawasan terhadap kegiatan di sekitar Waduk Cirata perlu ditingkatkan untuk mencegah penurunan kualitas Waduk Cirata ke tingkat yang lebih buruk lagi.

Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Riset Penelitian Budidaya Perikanan Jakarta yang telah berkenan memberikan biaya untuk kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, d.G. 2000. Teknik pengambilan contoh dan analisis biofisik sumberdaya pesisir. PKSPL. IPB. Bogor.
- BPWC. 2009. Presentasi BPWC : dalam sosialisasi Co Manajemen Perikanan Waduk Cirata untuk Stakeholder, DJPB – DKP. 14 – 17 April 2009.
- Boyd, C.E. 1982. Water quality for pond fish culture. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam. 312p.
- Boyd, C.E. and Lichtkoppler. 1988. Water quality management in pond fish culture. Auburn University, Auburn Alabama. 30p.
- Boyd, C.E. 1999. Management of Shrimp Ponds to Reduce the Eutrophication Potential of Effluents. The Advocate, December 1999 : 12-13.
- Brown, A.L. 1987. Freshwater Ecology. Heinermann Educational Books, London. 163p.
- Effendi, H. 2007. Telaah Kualitas Air : Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Penerbit Kanasius. Yogyakarta. 258 halaman.
- Emiyarti. 2004. Karakteristik fisika kimia sediment dan hubungannya dengan struktur komunitas makrozoobenthos di perairan Teluk Kendari. [Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian bogor.
- aeruddin. 2006. Analisis terpadu sediment dalam penetapan status pencemaran perairan estuaria wakak-Plambon Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. [Disertasi]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian bogor.
- Iriawan, N dan S.P. Astuti. 2009. Mengolah data statistik dengan mudah menggunakan Minitab 14. Penerbit : andi Yogjakarta. 469 halaman.
- Jeffries, M. dan Mills, D. 1996. Freshwater Ecology, Principles and Applications. John Wiley and Sons, Chichester, UK. 285 p.
- Kartamihardja, E.S. 1998. Analisis penyebab kematian ikan secara massal dalam karamba jaring apung di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Lap. Balitkanwar. 10 halaman.
- Mc. Donald, M.E, Tkkanen, C. A, Axler, R.P, Larsen, C.P dan Host, G. 1996. Fish Simulation Culture Modekl (FIS-C) : A Bioenergetics Based Model for Aquaculture. International Center For Living aquatic resources Management. Manila.
- Metcalf and Eddy. 1991. Wastewater Engineering : Treatment, Disposal and Dense. (3rd Edition). Mc Graw- Hill, Inc. New York. 1334 p.
- Moriaty, D.J.W. dan R.S.V. Pullin. 1987. Detritus and Microbial Ecology in Aquaculture International Center For Living Aquatic Resources Management. Manila.
- Nastiti, A.S, Krismono, dan E.S Kartamihardja. 2001. Dampak Budidaya Ikan Dalam Karamba Jaring Apung terhadap Peningkatan Unsur N dan P di Perairan Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia vol 7 (2) : 22-30.
- Odum, E.P. 1971. Fundamental of Ecology. W.B. Saunders Company, London-Toronto.
- Phillips, M.J, Clarke, R. dan Mowat, A. 1993. Phosphorus Leaching from Atlantic Salmon Diets, Aquacultural Engineering 12 (1993) : 47 - 54.
- Suwoyo, H.S. 2009. Tingkat konsumsi oksigen Sedimen pada dasar tambak intensif udang vaname. [Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian bogor.

- Taberima, S. 1999. Pengaruh penyawaan terhadap karakteristik beberapa jenis tanah. [Tesis]. Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian bogor.
- Tebbut, T.H.Y. 1992. Principles of Water Quality Control. Fourth Edition. Pergamon Press, Oxford. 251 p.

INTERNET SOURCES:

10%-

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5179/2009pur_abstract.pdf;sequence=1

19%-<https://id.123dok.com/document/eqo7mv5z-tingkat-perombakan-bahan-organik-sedimen-waduk-cirata-pada-kondisi-anaerobik-skala-laboratorium.html>
<1%<https://bisakimia.com/2016/11/03/bagaimana-pengolahan-limbah-cair-secara-anaerob/>

2% - <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/5179?show=full>

<1% - <https://aryaagh.wordpress.com/tag/jumlah-daun/>

<1%<https://docplayer.info/35606561-Modul-1-pengenalan-alat-laboratorium-mikrobiologi.html>

<1%<https://pt.scribd.com/document/6445611/Cage-aquaculture-Regional-reviews-and-global-overview>

<1%

https://www.reddit.com/r/askscience/comments/4qdc03/during_the_carboniferous_period_the_oxygen_level/

<1%-

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5491/2009srd_abstract.pdf;sequence=1

<1%<https://dnr.wi.gov/regulations/labcert/documents/training/Basics-GenChem.pdf>

<1% - <https://herawan12.wordpress.com/limbah/>

<1% - <http://unhalel.blogspot.com/2014/07/budidaya-ikan-kerapu.html>

<1% - <https://docobook.com/parameter-fisik-kimia-perairan-danau-limboto.html>

<1% - [http://jendalahewan.blogspot.com/2011/07/pengaruh-pakan-ikan-terhadap-kualitas.html](http://jendelahewan.blogspot.com/2011/07/pengaruh-pakan-ikan-terhadap-kualitas.html)

<1% - https://trik-budidaya-ikan.blogspot.com/p/blog-page_14.html

<1% - <http://ida-mulyani.blogspot.com/2012/05/>

<1% - <https://mirsangazali.wordpress.com/2014/12/page/2/>

<1%<http://geeknesia.com/projects/save-fisherman-sistim-peringatan-dini-upwelling>

<1%

<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/70664/C14lps.pdf;sequence=1>

<1%<https://id.123dok.com/document/dzx8w3vq-pendugaan-penvemaran-perairan-akibat-kegiatan-tambang-inkonvensional-ti-dan-keterkaitannya-terhadap-bentos-di-perairan-manggar-belitung-timur.html>

<1% - <https://docplayer.info/56139267-Adendum-andal-dan-rkl-rpl.html>
<1%-
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/59493/bab%20ii%20bahan%20dan%20metode.pdf?sequence=3>
<1%-https://mafiadoc.com/teknik-elektronika-lengkap_598e57da1723ddd069fb1b48.html
<1% - <https://hayunosakurablog.wordpress.com/category/lecture/page/2/>
<1% - <https://plus.google.com/110107650681738692251/posts/1BH3fXoxtKN>
<1% - <http://cillypoetra.blogspot.com/>
<1% - <https://ekamulyani.wordpress.com/2019/01/08/aktivitas-dan-laju-potensial-nitrifikasi-dan-denitrifikasi-di-perairan-waduk-jatiluhur/>
<1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19755/Chapter%20II.pdf;sequence=4>
<1% - <http://hensakti.blogspot.com/>
<1% - <http://idha-chemistry.blogspot.com/2016/05/kimia-air.html>
<1% - <https://contohmakalah28.blogspot.com/2017/02/makalah-tentang-budidaya-udang-windu.html>
<1% - <https://market.bisnis.com/read/20190111/7/877659/bursa-asia-sentuh-level-tertinggi-dalam-lima-pekan>
<1%-<https://kumpulanmakalah lengkap.blogspot.com/2014/05/makalah-pospat.html>
1% -
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/4509/Hasil%20dan%20Pembahasan_2009hss-5.pdf;sequence=10
<1% - http://www.academia.edu/8735574/MAKALAH_KARBON DIOKSIDA_AGRESIF
<1% - <http://jarimanisikan.blogspot.com/2014/>
<1% - <http://jefry-bp09.blogspot.com/2010/11/>
<1% - <http://kurniasih2.blogspot.com/2016/10/laporan-ph-dan-do.html>
<1% - <https://yulfiperius.files.wordpress.com/2011/07/mka.pdf>
<1% - <https://student.unud.ac.id/iramaresa/news/75310>
<1% - <http://el-andalucy.blogspot.com/2010/12/analisi-sulfat.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/115073545/2parameter-Kimia-Terhadap-Budidaya-Ikan>
<1%- <http://elfahrybima.blogspot.com/2009/01/hubungan-sulfur-dengan-budidaya-ikan.html>
<1%-<http://niariank.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>
<1% -
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/46958/Chapter%20II.pdf;sequence=3>
<1%-<https://id.123dok.com/document/wq221j2q-kontribusi-mangrove-dalam->

memerangkap-sedimen-di-wilayah-pesisir-kota-dumai-provinsi-riau.html
<1%-<https://id.123dok.com/document/eqo7km5z-identifikasi-dan-penentuan-faktor-faktor-utama-penyebab-tanah-longsor-di-kabupaten-garut-jawa-barat.html>
<1% -
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/56710/C12age_BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf
<1% - <https://id.123dok.com/document/4zpg020z-perbedaan-ketebalan-integrasi-dasar-perairan-dengan-instrumen-hidroakustik-simrad-ey-60-di-perairan-kepulauan-pari.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/89721042/LINDI>
<1% -
<http://www.dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=artikel&idMenuKiri=&cari=&page=1-<1% - https://fauzimsp.wordpress.com/>
<1%-<https://www.slideshare.net/89koushikroy/limnology-of-two-unmanaged-urban-and-peri-urban-ponds-of-chhattisgarh-in-relation-to-fish-culture>
<1% -
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/9263/Daftar%20Pustaka%202008fht.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
<1% -
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/40613/2006aso.pdf?sequence=9&isAllowed=y>
<1% -
<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/43833/10/Daftar%20Pustaka%202007mah.pdf>
<1% -
<https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55240/Daftar%20Pustaka.pdf?sequence=14>
<1% -
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46641/Daftar%20Pustaka_%202011kus.pdf
<1% - http://www.academia.edu/16663864/Laporan_Limnologi_Sungai_Siak_